



HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

Tarih:

Hastanın Adı Soyadı:

Yaşı:

Yattığı Bölüm:

Değerlendirme Gerekçesi/Numarası

1	İlk Değerlendirme	2	Post-Op. Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği	5	Durum Değişikliği
---	-------------------	---	----------------	---	---------------	---	-------------------	---	-------------------

RİSK FAKTÖRLERİ

DEĞERLENDİRMELER

Değerlendirme Numarası

RİSK FAKTÖRLERİ		DEĞERLENDİRMELER				
		Değerlendirme Numarası				
	
		Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:
	/...../...../...../../...../...../...../...../...../.....
1.	Nörolojik hastalığı/semptomu var.	5	5	5	5	5
2.	Oksijenlenme değişikliği var.	5	5	5	5	5
3.	Düşme riski açısından özellikli hastalığı/semptomu var.	15	15	15	15	15
4.	Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.	5	5	5	5	5
5.	Görme engeli var.	5	5	5	5	5
6.	Hastaya bağlı 3 ve üstünde bakım ekipmanı var.	5	5	5	5	5
7.	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.	5	5	5	5	5
8.	Hasta post-op. ilk 48 saatlik dönemde.	5	5	5	5	5
9.	Riskli ilaç kullanımı var.	5	5	5	5	5
TOPLAM PUAN						
Değerlendirmeyi Yapan Hemşire:						

YÜKSEK RİSK

Toplam puanı 15 ve üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilmeli ve bu hastalarda Dört Yapraklı Yonca sembolü kullanılmalıdır.

Bilgilendirme tablosuna bakınız.

HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ
Bilgilendirme Tablosu

Nörolojik Hastalıklar/Semptomlar	<ul style="list-style-type: none">• Epilepsi• Mental Retardasyon• Konvülsiyon• Denge bozukluğu• Kooperasyon bozukluğu vb.
Oksijenlenme Değişiklikleri	<ul style="list-style-type: none">• Solunum Hastalıkları• Dehidratasyon• Anemi• Anoreksi• Senkop• Baş Dönmesi• Asidoz• Ödem• Hipotansiyon vb.
Özellikli Hastalıklar/Semptomlar	<ul style="list-style-type: none">• Cam Kemik Hastalığı• Hemofili• Trombositopeni• İdiopatik Trombositopenik Purpura
Hastane yönetimi tarafından hastanın yaşına, genel durumuna, boy-kilo vb. özelliklerine göre uygun yatak tanımlaması yapılmalıdır.	
Hasta Bakım Ekipmanları	<ul style="list-style-type: none">• IV İnfüzyon• Solunum Cihazı• Kalıcı Kateter• Dren• Perfüzator• Pacemaker vb.
Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyaç durumu yürüme kabiliyetini edinmiş hastalarda değerlendirilir.	
Riskli İlaçlar	<ul style="list-style-type: none">• Hipnotikler• Barbitüratlar• Nöroleptikler• Antidepresanlar• Laksatifler/Diüretikler• Narkotikler• Kemoterapötikler• Sedatifler• Antihipertansifler• Antidiyabetikler