



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Hepatit, siroz ve karaciğer kanserinin en sık sebebidir.

Tedavisi nedir?


- ▶ Ağızdan alınan ilaçlarla 3 ay gibi kısa sürede hastalar tedavi edilebilmektedir.
- ▶ Hepatit C'nin aşısı yoktur.

Tedavi edilen kişiye hepatit C yeniden bulaşır mı?

- ▶ Damar içi madde kullanımı ve ortak enjektör kullanımıyla hepatit C yeniden bulaşabilir.

Damar içi madde kullananlara başka hangi virüsler bulaşabilir?

- ▶ Hepatit B ve HIV bulaşabilir.
- ▶ Bu nedenle hepatit B ve HIV testlerinizi yaptırın.
- ▶ HBsAg ve anti-HBs negatif ise hepatit B aşınızı yaptırın.



HEPATİT C TESTİNİZİ YAPTIRDINIZ MI?

Hekiminize Başvurunuz.

 /saglikbakanligi
hsgm.saglik.gov.tr

Hepatit C hastalığı nedir?

- ▶ Hepatit C virüsünün (HCV) neden olduğu ciddi bir karaciğer hastalığıdır.


Nasıl bulaşır?

- ▶ Anneden bebeğe gebelik süresince ve doğum sırasında,
- ▶ Güvenli olmayan kan ve kan ürünlerinin nakliyle,
- ▶ Korunmasız cinsel ilişkiyle,
- ▶ Ortak kullanılan enjektörlerle,
- ▶ Sterilizasyon ve dezenfeksiyonu yapılmamış cerrahi malzemelerin, kesici ve delici aletlerin kullanımıyla,
- ▶ Açık yara veya kesilerden bulaşabilir.

Damar içi madde kullananlarda hepatit C sıklığı yüksektir!

Belirtileri nelerdir?

- ▶ Hastalık sessiz ve sinsi seyredebilir.
- ▶ En sık görülen belirtiler halsizlik ve yorgunluktur.
- ▶ Bulaşma olduktan sonra hastalık çoğunlukla kronikleşerek siroza veya karaciğer kanserine yol açabilmektedir.



Tanı nasıl konulur?

- ▶ Basit bir kan testiyle tanı konur.
- ▶ Test sonucunun pozitif çıkması durumunda enfeksiyon hastalıkları veya gastroenteroloji uzmanına başvurmak gerekir.
- ▶ Madde kullanımı bırakılmadıkça hepatit C'nin bulaşma riski de devam eder. Bu nedenle testlerin tekrar yapılması gerekir.

