

تتطلب الوقاية من مرض حبة الشرق أخذ الاحتياطات  
اللازمة التالية:

إرتداء الملابس التي تغطي كافة اجزاء الجسم وعدم البقاء  
لمدة طويلة في الاماكن المكشوفة بعد الغروب.

إستخدام ناموسيات واقية للنوافذ خاصة بحشرة ذبابة الرمل.

إستخدام ناموسيات واقية حول السرير خاصة بذبابة الرمل.

إستخدام طارد ذباب.

إستخدام أجهزة تهوية في الاماكن المغلقة مثل المراوح  
لتشكيل تيار هواء.

عدم ترك المخلفات والاسمدة العضوية مكشوفة.

إنشاء الحظائر على مسافة موصى بها من المنازل.

عمل اللياسة لجدران المنازل والحظائر ومعاملتها بطبقة من  
الكلس والمحافظة على نظافتها.



## جفف مستنقعات المياه الموجودة بجوار المنازل !!!

لأن كل ١ متر مربع من هذه المستنقعات  
يمكن أن يتواجد فيها عشرات الآلاف من  
بيوض ذبابة الرمل.




T.C. Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Halk Sağlığı  
Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı

الجمهورية التركية وزارة الصحة

# الليشمانيا او حبة الشرق (داء الليشمانيا الجلدي)



T.C. Sağlık Bakanlığı  
الجمهورية التركية وزارة الصحة

يلاحظ الإصابة بالمرض في اجزاء الجسم المكشوفة بكثرة في الوجه واليدين والقدمين



### حبة الشرق


تنتشر داء الليشمانيا من جراء لدغ ذبابة الرمل (ذبابة الفاصدة) الحاملة للطفيلي المسبب لمرض الليشمانيا وهي مرض جلدي.



تبدأ الإصابة في الوجه واليدين والقدمين والذراعين في الاجزاء المكشوفة من الجسم على شكل حبة شباب أخذة بالإتساع وبدون ألم.

**يجب مراجعة أقرب مركز صحة في حال إستمرار الإصابة بالمرض لمدة تجاوزت الشهر!**

في حال عدم اللجوء إلى العلاج: تترك آثار مستديمة في الجلد، تقوم ذبابة الرمل بنقل طفيلي مرض الليشمانيا إلى ناس آخر وذلك بتموضعها على الجروح الملتهبة .



### ذبابة الرمل (ذبابة الفاصدة):

تتواجد ذبابة الرمل غالبا في الحظائر، والجحور، واكوام الاسبدة العضوية، والتشققات الموجودة في جذوع الأشجار، وتشققات الجدران، وأعشاش القوارض أثناء النهار، وتنشط الحشرة في الليل مشكلة خطورة للبشر.



### ضرورة العلاج في حالة الإصابة!

تقوم وزارة الصحة بتوفير الأدوية المستخدمة في علاج مرض حبة الشرق **مجانا**.

